

వరి సాగులో చేపట్టాల్సిన చర్యలు

ప్రస్తుతం యాసంగి వరి సాగ్గ 10-20 రోజుల దశలో ఉన్నాయి. కొన్నిప్రాతిలో వీరిసాగ్గ కూడా పూర్వమైయాయి. రష్టపనాలో వెళ్లు శాతం పంట నారుమడి దశలో ఉన్నది. పూర్వపాయి అధికారులు, విభిన్న వీరిసాగ్గ విభాగాలు ద్వారా అంయతన్న సమారాం మేరక వరి నారుమడిలో అగ్గతె గులు అశిండంతో పాటు కాండం తొలిచే రెక్కల పురగలను గమనించాం. ప్రస్తుత రాష్టులో నెలకొన్న వాతావరణ వరి ఫీటులు కూడా అగ్గితెలులు అశించానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అలాగే గత కొన్నిప్రాతిలో అముఖాలు ద్వారా యాసంగి కండం తొలిచే పురగలు తోలి ద్వారా ఉన్నిటిని విస్తరించి సమయంలో నొటింగ్ చర్యలు చేపడినప్పుడు తగించుకోవచ్చు. యాసంగిలో స్వాచాలిక

కాండం తొలిచే పురగు

- యాసంగి వరిలో కాండం తొలిచే పురగు ప్రధానమైన సమయాలు.
- ఈ పురగు నారుమడి దశ నుంచి పంట అభఱ వరకు అశించి సుమారు 3-4 బోల్లు దిగుబడి స్థాపించే అవకాశం ఉన్నది.
- ప్రస్తుత నారుమడి దశలో ఉన్న యాసంగి పరిలో కూడా రెక్కల పురగు ఉన్నతి గమ నించాం.
- పీలకల దశలో మొఘ్య చనిపోవడం, అలాగే

సాగు చేసుకునే రకాలు

రుపాటు, బెండ, పంకాయల్తో పాటు అన్నిరకాల తీగజాతి కూరగాయలను సాగుచేసుకోవచ్చు. ఆకుకూరల్తో తోటపార, మెంకి, కొత్తమిర, గోంగార, అయితే కొత్తమిరకు నీడను ఏర్పాటు చేసుకుంటే దిగుబడి పెంచుకోవచ్చు. వాతావరణ పరిశీతులు ద్వారా పెట్టిని అంట ఉష్ణోగ్రహ తల్పులనే రకాలను కొప్పాల్సిపాచాలి. దీనిలో నీని ఎద్దడి ద్వారా పోషించిని ద్వారా ఉన్న రకాలను ఎంచుకోవాలి.

నేల తయారీ

సాగు చేసుకుండు ముఖ్యంగా సమస్యాత్మక నేలలు లేకుండా చూపుకోవాలి. నీని వసతి ఉండాలి. నేను బాగా దుక్కి దుష్టుకోవాలి. ఎరువెలలు, ఇసుక కలిగి ఉన్న నేలలో సాగుచేసుకోవచ్చు.

ఎరువులు

సత్కని, భాస్యరం, పొత్తాష్ ఇవి సూలపోపకాలు. పీటిలో పూర్తిగా భాస్యరం, పంపుల ఎరువు అభిరుద్ధిలో వేసుకోవాలి. పంపుల ఎరువుల ముఖ్యంగా సూక్ష్మాంశులు ఎవ్వుగా ఉంటాయి. పంపుల ఎరువు వెకాసికి 8 నుంచి 10 ఉన్నలు వేసుకోవాలి. దీనిను తెచ్చు పీటి ఉంటే గుణం ఉండాలి. మొక్కకు అవసరపున సూక్ష్మపోపకాలు అందుతాయి. పంపుల ఎరువు కాపుండా పంపీపోపకాలు అందుతాయి. పంపుల ఎరువు కాపుండా పంపీపోపకాలు అందుతాయి. ఇందులో భాస్యరం 800 నుంచి 1000 కిలోగ్రాముల వేసుకోవాలి. ఇందులో భాస్యరం 800 నుంచి 1000 కిలోగ్రాముల వేసుకోవాలి. అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి కారోపూర్వ రాన్ ఓజికిల్లు 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి కారోపూర్వ రాన్ ఓజికిల్లు 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి కారోపూర్వ రాన్ ఓజికిల్లు 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంతా సమాంగా చల్లాలి.

అంతర సుమిలు విరుపొట్టి దశలో ప్రతి 40 మొక్కలకు ఒక రెక్కల పురగుల లేదా గడ్డ సమయాంయి లేదా వెకాసికి 3 రోల్లోపు వెకాసికి 10 కిలోగ్రాములు దేశాభాష్య ప్రోఫ్సోర్స్ 0.4 కిలోగ్రాములు 4 కిలోలు నీరు పులుచగా ఉంటి పొలం అంత

